



南京爱贝生物科技有限公司

即用型孕马血清促性腺激素 (PMSG)

即用型人绒毛膜促性腺激素 (hCG)

粉末型孕马血清促性腺激素 (PMSG)

粉末型人绒毛膜促性腺激素 (hCG)

使用说明书

型号: M2520 M2620 规格: 2ml*10 支 成分: 50IU/ml 保存条件: -20°C冻存

型号: M2530 M2630 规格: 2000IU/盒 保存条件: 室温保存, 溶解后 -20°C冻存

有效期: 见试剂盒外标签

本产品仅供科研使用, 请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途

使用方法

1、即用型孕马血清促性腺激素、即用型人绒毛膜促性腺激素终浓度为 50IU/ml, 请及时放入-20°C冻存。

2、粉末型孕马血清促性腺激素、粉末型人绒毛膜促性腺激素试剂盒内耗材已经配齐, 包含 40ml 生理盐水、1ml 注射器、灭菌 2ml 冻存管, 激素均为 1000IU*2 支/盒, 将两支共 2000IU 溶解至 40ml 生理盐水中, 最终浓度为 50IU/ml。

操作步骤:

打开 hCG/PMSG 瓶盖, 用注射器从 40ml 生理盐水瓶中吸取生理盐水溶解 hCG/PMSG, 将激素溶液打回 40ml 生理盐水瓶中, 再次用注射器吸取生理盐水反复冲刷 hCG/PMSG 瓶, 尽量将 hCG/PMSG 全部溶解至 40ml 生理盐水内。用灭菌巴氏吸管将 40ml 溶解激素分装至冻存管内, 2ml/管, 贴上小标签, -20°C


冻存。

注意事项

- 1、无菌操作；
- 2、溶解后的激素在室温下容易失效，请尽快放入 -20°C 保存；
- 3、冻存的激素室温解冻，反复颠倒混匀后，每只小鼠腹腔注射 0.1-0.2ml (5-10IU)。未用完试剂请及时放回 -20°C 冻存，请勿反复冻融。

小鼠促排卵方法

1. 第一天：晚 7 点雌鼠注射 PMSG，5-10UI/只。
2. 第三天：48h 后晚 7 点注射 hCG，5-10UI/只(注意 PMSG 与 hCG 之间间隔时间不能小于 48 小时)。
3. 第四天：在注射 hCG 后 13-18h 进行受精，约第四日早 9 点-11 点杀鼠取卵。



附图：小鼠腹腔注射

地 址：江苏省南京市高新区东大路 2 号

手 机：17130388944 (销售，微信同号)

办 公 室：025-66068668 (9:00-18:00)

电子邮件：njabsw@163.com

QQ：3595143129 (销售)、1497503894 (技术支持)